



**Gabarito da 1ª Prova de Geometria Analítica e Cálculo Vetorial 1 – 2/2014**  
**27/09/2014**

1. [2 pontos] Verifique se é verdadeira ou falsa cada uma das afirmações abaixo e justifique sua resposta.

- (a) Se  $\vec{u} \neq \vec{0}$  e  $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot \vec{w}$ , então  $\vec{v} = \vec{w}$   
(b) Se  $|\vec{u} \cdot \vec{v}| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\|$ , então  $\vec{u}$  e  $\vec{v}$  são paralelos.

**Solução:**

(a)

1,0

Falso. Note que se  $\vec{u} = (1, 0)$ ,  $\vec{v} = (0, 1)$  e  $\vec{w} = (0, 0)$ , então

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot \vec{w} = 0, \text{ mas } \vec{v} \neq \vec{w}.$$

(b)

1,0

Verdadeiro. De fato, Se  $\vec{u} = \vec{0}$  ou  $\vec{v} = \vec{0}$ , então, por definição, eles são paralelos. No caso em que  $\vec{u} \neq \vec{0}$  e  $\vec{v} \neq \vec{0}$ , seja  $\theta$  o ângulo entre  $\vec{u}$  e  $\vec{v}$ . Neste caso, temos que

$$\|\vec{u}\| \|\vec{v}\| |\cos \theta| = |\vec{u} \cdot \vec{v}| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \Rightarrow |\cos \theta| = 1 \Rightarrow \theta = 0 \text{ ou } \theta = \pi.$$

Logo, eles são paralelos.

2. [2 pontos] Determine a equação da circunferência que passa pelos pontos  $A = (3, 2)$  e  $B = (2, -1)$  e cujo centro pertence à reta  $x + y - 1 = 0$ .

**Solução:**

0.5

Sabemos que a  $r : x + y - 1 = 0$  tem equações paramétricas dadas por

$$r : \begin{cases} x = t, \\ y = 1 - t, t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Com isso temos que um ponto sobre a reta  $r$  é da forma  $P = (t, 1 - t)$ .



1,0

Queremos encontrar  $t \in \mathbb{R}$  tal que

$$d(A, P) = d(B, P).$$

Neste caso,

$$\begin{aligned}d(A, P) &= d(B, P) \\ \Rightarrow \sqrt{(t-3)^2 + (-1-t)^2} &= \sqrt{(t-2)^2 + (2-t)^2} \\ \Rightarrow (t-3)^2 + (-1-t)^2 &= (t-2)^2 + (2-t)^2 \\ \Rightarrow (t-3)^2 + (t+1)^2 &= 2(t-2)^2 \\ \Rightarrow 2t^2 - 4t + 10 &= 2t^2 - 8t + 8 \\ \Rightarrow t &= -\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

Substituindo  $t = -1/2$ , temos que  $P = (-1/2, 3/2)$  é o centro da circunferência.

0,5

Além disso, o raio da circunferência é dado por

$$d(B, P) = \sqrt{\frac{25}{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{2}.$$

Com isso, a equação da circunferência é:

$$\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{25}{2}.$$

3. [2 pontos] Determine as equações das retas que passam pelo ponto  $P = (2, -1)$  e formam um ângulo de  $\pi/4$  com a reta  $2x - 3y + 7 = 0$ .

**Solução:**

0,5

Sabemos que um vetor paralelo à reta  $r : 2x - 3y + 7 = 0$  é o vetor

$$\vec{v} = (3, 2).$$

Basta encontrarmos os vetores que formam um ângulo de  $\pi/4$  com  $\vec{v}$ , ou seja, encontrar  $\vec{u} = (a, b)$  tal que

$$\frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$



1,0

Multiplicando esta última igualdade por  $2\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|$  e elevando ao quadrado, temos que

$$\begin{aligned}2|\vec{u} \cdot \vec{v}|^2 &= \|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2 \\ \Rightarrow 2(3a + 2b)^2 &= 13(a^2 + b^2) \\ \Rightarrow 18a^2 + 24ab + 8b^2 &= 13a^2 + 13b^2 \\ \Rightarrow 5a^2 + 24ab - 5b^2 &= 0 \\ \Rightarrow 5\left(a^2 + \frac{24}{5}ab + \frac{144}{25}b^2 - \frac{144}{25}b^2\right) - 5b^2 &= 0 \\ \Rightarrow 5\left(a + \frac{12}{5}b\right)^2 - \frac{169}{5}b^2 &= 0 \\ \Rightarrow \left[\sqrt{5}\left(a + \frac{12}{5}b\right) - \frac{13\sqrt{5}}{5}b\right] \left[\sqrt{5}\left(a + \frac{12}{5}b\right) + \frac{13\sqrt{5}}{5}b\right] &= 0 \\ \Rightarrow \left[\sqrt{5}a - \frac{\sqrt{5}}{5}b\right] \left[\sqrt{5}a + 5\sqrt{5}b\right] &= 0 \\ \Rightarrow 5a = b \quad \text{ou} \quad a = -5b.\end{aligned}$$

Neste caso, temos que

$$\vec{u} = (a, 5a) \quad \text{ou} \quad \vec{u} = (-5b, b) \Rightarrow \vec{u} = a(1, 5) \quad \text{ou} \quad \vec{u} = b(-5, 1).$$

Com isso, temos que os vetores diretores das retas procuradas são  $\vec{u}_1 = (1, 5)$  e  $\vec{u}_2 = (-5, 1)$ .

0,5

Logo as equações das retas procuradas são da forma

$$5x - y + c_1 = 0 \quad \text{e} \quad x + 5y + c_2 = 0.$$

Substituindo o ponto  $P = (2, -1)$  em ambas as equações obtemos que

$$c_1 = -11 \quad \text{e} \quad c_2 = 3.$$

Logo as retas procuradas tem equações dada por:

$$5x - y - 11 = 0 \quad \text{e} \quad x + 5y + 3 = 0.$$

4. [2 pontos] Considere os pontos  $A = (0, 0)$ ,  $B = (1, 0)$  e a reta  $r : 2x - y + 2 = 0$ . Encontre os pontos sobre a reta  $r$  que formam com  $A$  e  $B$  um triângulo de área 1.

**Solução:**



1,0

Note que a reta  $r : 2x - y + 2 = 0$  tem equações paramétricas dadas por

$$r : \begin{cases} x = t \\ y = 2t + 2, t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Com isso um ponto sobre a reta  $r$  é da forma  $P = (t, 2t + 2)$ . Queremos encontrar  $t \in \mathbb{R}$  tal que o triângulo  $\Delta APB$  tenha área 1.

0,5

Sabemos que a área deste triângulo é dada por

$$A = \frac{1}{2} \sqrt{\|\vec{AP}\|^2 \|\vec{AB}\|^2 - (\vec{AP} \cdot \vec{AB})^2}.$$

0,5

Note que

$$\vec{AP} = (t, 2t - 2), \vec{AB} = (1, 0), \|\vec{AP}\|^2 = 5t^2 + 8t + 4, \|\vec{AB}\|^2 = 1 \text{ e } (\vec{AP} \cdot \vec{AB})^2 = t^2.$$

Daí, substituindo na fórmula da área do triângulo e igualando a 1 temos que

$$\sqrt{5t^2 + 8t + 4 - t^2} = 2 \Rightarrow 4t^2 + 8t + 4 = 4 \Rightarrow t(t + 2) = 0 \Rightarrow t = 0 \text{ ou } t = -2.$$

Logo,  $P = (0, 2)$  ou  $P = (-2, -2)$ .

5. [2 pontos] Determine a equação reduzida, principais elementos (foco(s), eixos, equações das retas importantes (ou diretriz ou eixo ou assíntotas), vértices, excentricidade, etc.), além de um esboço da cônica de equação  $x^2 + 36y^2 - 10x + 16 = 0$

**Solução:**

0,5

Primeiramente, vamos completar o quadrado da equação a fim de obtermos a equação reduzida da cônica.

$$\begin{aligned} x^2 + 36y^2 - 10x + 16 &= 0 \\ \Rightarrow x^2 - 10x + 25 - 25 + 36y^2 + 16 &= 0 \\ \Rightarrow (x - 5)^2 + 36y^2 &= 9 \\ \Rightarrow \frac{(x - 5)^2}{9} + \frac{y^2}{\frac{1}{4}} &= 1 \end{aligned}$$



0,5

Diretamente da equação reduzida sabemos que a cônica é uma elipse, com semi-eixo maior paralelo ao eixo  $OX$  de tamanho  $a = 3$ , semi-eixo menor paralelo ao eixo  $OY$  de tamanho  $b = 1/2$  e centrada em  $P = (5, 0)$ .

0,5

Além disso, sendo  $2c$  a distância entre os dois focos sabemos que

$$c^2 = a^2 - b^2 = 9 - \frac{1}{4} = \frac{35}{4} \Rightarrow c = \frac{\sqrt{35}}{2}.$$

Com isso temos que a excentricidade é:

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{35}}{6}.$$

Como a elipse está centrada em  $P = (5, 0)$  temos que os eixos de simetria são as retas  $x = 5$  e  $y = 0$ . Além disso, sabemos que os focos são:

$$F_1 = \left(5 - \frac{\sqrt{35}}{2}, 0\right) \quad \text{e} \quad F_2 = \left(5 + \frac{\sqrt{35}}{2}, 0\right)$$

0,5

Abaixo segue o esboço da elipse.

